

3DCultr Lung Cancer Organoid Growth Medium (Human)

3DCultr 人肺癌类器官培养基

产品简介

3DCultr 人肺癌类器官培养基是一种无血清可应用于细胞或组织来源的肺癌类器官的建立和长期培养过程，在细胞外基质存在的条件下，培养基所含特有组分及丰富的细胞因子能促使肺癌细胞迅速生长并形成肺癌类器官，类器官形成过程平稳且迅速，同时保持较高的肺癌细胞特性和活力，为后续基于肺癌类器官的生理功能、疾病研究和精准医学提供支持。

产品信息

货号	C231110E/C231110S/C231110M
规格	50 mL/100 mL/500 mL

组分信息

组分编号	组分名称	C231110E	C231110S	C231110M
C231110-A	Lung Cancer Organoid Growth Medium	45 mL	90 mL	450 mL
C231110-B	Nutritional components (10×)	5 mL	10 mL	50 mL

储存条件

-20°C储存，有效期1年；2~8°C储存，有效期1月。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
2. 产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行。
3. 本产品仅用于科研。

使用说明

1. 人肺癌类器官完全培养基配制

无菌操作条件下配制肺癌类器官完全培养基。以下是准备 100 mL 完全培养基操作流程，如所需量不同，可相应调整用量。

- 1) 将组分 B 室温解冻或者 2~8°C 过夜缓融。避免反复冻融，现配现融；
- 2) 将组分 A 基础培养基 90 mL 冰箱取出恢复至室温；
- 3) 将 10 mL 组分 B 加入到组分 A 基础培养基内，均匀混合；如暂不使用，短时 2~8°C 储存。
- 4) 使用时可加入 1% 双抗使用。

2. 人源肺癌原代培养

- 1) 取材：标本离体后，尽快取材。采用无菌器械，保证无菌环境，将肿瘤组织放入含有 5 mL 的原代组织保存液的 15 mL 离心管中，4°C 转运。
- 2) 清洗：在生物安全柜中取出样品管，去除组织保存液，加入适量冷的添加有双抗的 PBS，反复清洗后，去除 PBS。
- 3) 重复清洗：重复第 2 步骤 3 次。
- 4) 组织处理：去除 PBS 缓冲液后，将组织块移至 10 cm 含 10 mL 冷原代组织保存液的无菌培养皿中，用无菌眼科显微剪将组织剪碎（直径约 0.5 mm~1 mm）。
- 5) 重复清洗：使用常温 PBS，重复第 2 步骤 3 次。
- 6) 收集组织碎片，加入组织消化液消化 20~30 min，过 70 μm 筛网，收集肺癌细胞。
- 7) 红细胞裂解：加入 10 mL 红细胞裂解缓冲液，室温下在翘板摇床上摇 10 min。
- 8) 重复清洗：裂解完毕，使用常温 DMEM/F12，重复第 2 步骤 3 次。
- 9) 类器官种板：调整细胞密度为 $2\sim 3 \times 10^6$ ，与基质胶 1:1 均匀混合，将细胞混悬液以 40~60 μL 每孔种在 24 孔板中，37°C 放置 15~30 min，加入预热的类器官培养液，每个孔 750 μL 。
- 10) 类器官培养：将培养板放在 37°C CO₂ 培养箱培养。每 2 天更换培养液。加入培养液时，吸头朝向侧壁，缓慢加入。
- 11) 类器官观察：每天观察类器官并拍照，了解初始类器官数量、增殖速度、形态、微生物污染情况等。