

2×PCR Master Mix (No Dye) 2×常规 PCR 预混液（不含染料）

产品简介

本品是即用型的常规 PCR 预混合溶液，含有 Taq DNA Polymerase、dNTP 混合物、MgCl₂ 以及优化的缓冲体系。反应时只需加入引物和模板即可进行扩增，大大简化实验的操作步骤。产品中含有溴酚蓝染料，PCR 产物可以直接进行电泳。本产品中含有优良的稳定剂，在 4℃条件下可以放置 3 个月。PCR 产物具有 3' -dA 突出端，可轻松克隆至 T 载体。

产品规格

产品货号	N132003E	N132003S	N132003M	N132003L
产品规格	1 mL	5×1 mL	50×1 mL	100×1 mL

产品储存

-25~-15℃储存，有效期 2 年。干冰运输。

操作注意

1. 本产品 PCR 产物不适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！

操作说明

1. PCR 反应体系和程序

组分	体积 (μL)
模板 DNA	适量
Primer 1 (10 μM)	2
Primer 2 (10 μM)	2
2×PCR Master Mix (No Dye)	25
ddH ₂ O	to 50

表 1 扩增体系 (50 μL)

循环步骤	温度 (°C)	时间	循环数
预变性	94	5 min	1
变性	94	30 sec	35
退火	50-60	30 sec	
延伸	72	30-60 sec/kb	
终延伸	72	10 min	1

表 2 扩增条件

【注】：使用前请务必将其彻底混匀。

- 1) 模板使用量：基因组 DNA：50-200 ng；质粒 DNA：0.1-10 ng。
- 2) Mg²⁺浓度：本产品中含有 3 mM 的 MgCl₂，适合大部分 PCR 反应。
- 3) 退火温度：请参考引物的理论 Tm 值，退火温度可设置低于引物理论值 2-5℃。

4) 延伸时间: 分子鉴定建议 30 sec/kb。基因克隆建议 60 sec/kb, 以保证产物量达到最高。

应用实例




图 1: 2×PCR Master Mix 扩增 1.2 kb 片段。产品分别在-20°C 放置 1 年, 4°C 放置 3 个月, 25°C 放置 1 个月后可有效扩增目的片段。

模板: 拟南芥基因组; 退火温度: 60°C; 延伸时间: 40 sec。